



Vor der OP

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient!

Sie können bereits in der Zeit vor einer Lidoperation einige Maßnahmen setzen, um den Heilungsverlauf positiv zu beeinflussen.

Verhalten vor einer Lidoperation

Bitte nehmen Sie circa 10 Tage vor dem Eingriff keine blutverdünnenden Präparate ein. Dazu zählen acetylsalicylsäurehaltige Medikamente (z. B. Aspirin, ASS etc.) oder auch Multivitaminpräparate. Ich berate Sie diesbezüglich ausführlich im Vorgespräch.

Raucher sollten mindestens 14 Tage vor der Operation auf Nikotin verzichten. Nikotin vermindert die Durchblutung der Haut und kann die Wundheilung erheblich verzögern.

Um einen rascheren Rückgang der operationsbedingten Schwellung zu unterstützen, können Sie eine Woche vor und zwei Wochen nach dem Eingriff Arnikaglobuli einnehmen.

Am Tag der Operation sollten Sie die Lider mit Cool Bags kühlen. Falls Sie keine zu Hause haben, besorgen Sie bitte welche in einer Apotheke.

Gegen eventuelle leichte Schmerzen sollten Sie Schmerzmittel wie z. B.

Parkemed 500 mg oder Ähnliches bereithalten. Auf keinen Fall dürfen Sie Aspirin einnehmen.

ACHTUNG: Am Tag der Operation besteht Fahruntauglichkeit! Bitte bringen Sie eine Begleitperson mit, die Sie nach dem Eingriff nach Hause bringen kann. Erst wenn Sie die Augen gut öffnen können und wieder beschwerdefrei sind, beginnen Sie wieder mit dem Autofahren. Bei den meisten Patientinnen und Patienten ist dies bereits am nächsten Tag der Fall.

Sollten in der Zeit vor Ihrem Operationstermin Fragen auftauchen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren: office@augenarzt-klagenfurt.at
Wir rufen Sie schnellstmöglich zurück.

Dr. Monika Haderlapp
Fachärztin für Augenheilkunde
und Optometrie
Gutenbergstraße 7
9020 Klagenfurt

Tel.: 0463 50 20 10
Fax: 0463 50 20 10 20
office@augenarzt-klagenfurt.at
www.augenarzt-klagenfurt.at

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Dr. Monika Haderlapp